

El conseller de Sanidad ha presentado, esta mañana, la nueva campaña de vacunación contra la gripe

Rambla: “La conselleria de Sanidad distribuirá 850.000 dosis de vacuna contra la gripe en la campaña 2005-2006”

- La conselleria de Sanidad informará de las ventajas de vacunarse contra la gripe a través de mensajes sms y de correos electrónicos.
- Se ha ampliado el grupo de riesgo a personas de 60 ó más años.

Valencia (22-9-05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha presentado, esta mañana, la campaña contra la gripe 2005-2006, “en la que la conselleria de Sanidad distribuirá 850.000 dosis de vacuna, que comenzarán a administrarse a la población a partir del 26 de septiembre”. Del total de dosis adquiridas, 99.000 dosis se distribuirán en la provincia de Castellón, 450.100 dosis en Valencia, y 300.900 dosis en la provincia de Alicante.

Según ha destacado Rambla, “se han adquirido, por tanto, 128.800 dosis de vacuna más que en la campaña anterior, con un coste total de 5.298.000 euros, un 27,12% más que en 2004”.

Rambla ha recordado que “la campaña contra la gripe va dirigida a divulgar entre los ciudadanos la necesidad de vacunarse contra una enfermedad con una gran repercusión no solo sanitaria, sino también laboral y económica, y cuya incidencia hay que minimizar tomando para ello todas las medidas posibles”.

En este sentido, el conseller de Sanidad ha destacado que “la importancia de la gripe deriva de su elevada capacidad de difusión, su alta morbilidad, y las complicaciones que puede producir, sobre todo en las personas mayores, en las que padecen enfermedades cardiorespiratorias, crónicas y metabólicas, y en los inmunodeprimidos”.

Así, Rambla ha señalado que “el periodo óptimo para la vacunación individual contra la gripe es durante los meses de octubre y noviembre”.

Grupos de riesgo

Con respecto a los grupos en los que está especialmente indicada la vacunación contra la gripe, el conseller de Sanidad ha señalado que “con el fin de mejorar la efectividad y la eficiencia de la vacunación, para la temporada 2005-2006, en la Comunidad Valenciana se ha modificado y ampliado los grupos de riesgo al de las personas de 60 o más años”.

De esta forma, los grupos de riesgo estarán conformados por: adultos o niños con procesos crónicos cardiorespiratorios; enfermos crónicos residentes en instituciones cerradas; enfermos afectados de procesos metabólicos crónicos, disfunción renal, hemoglobinopatías o inmunodeprimidos; personas mayores de 59 años no incluidos en los grupos anteriores; niños sometidos a tratamientos prolongados con salicilatos, y mujeres embarazadas de 2º y 3º trimestre durante la temporada de la gripe.

Otros grupos en los que se indica la vacunación son: el personal sanitario; las personas que tienen contacto cercano o cuidan a pacientes incluidos en alguno de los grupos de riesgo anteriores, y el personal de servicios especiales –policías, bomberos, funcionarios de prisiones-, así como trabajadores de granjas avícolas y profesionales sanitarios que trabajan en mataderos.

Novedades de la campaña 2005-2006

Junto a la iniciativa de ampliar los grupos de riesgo al de las personas de 60 o más años, Rambla ha destacado que la conselleria de Sanidad ha incluido otras novedades en la campaña 2005-2006.

El Conseller ha afirmado que “durante esta temporada antigripal, la conselleria de Sanidad remitirá, mediante mensajes sms, a las personas mayores de 60 años, información sobre las ventajas de vacunarse contra la gripe, y mediante correos electrónicos, a los profesionales sanitarios, recordándoles la importancia de que se vacunen, ya que juegan un importante papel en la transmisión del virus”.

Otras novedades que ha destacado Rambla son “la adhesión de las empresas generadoras de salud a la vacunación antigripal, de forma que las empresas adheridas ofertarán la vacuna a los trabajadores de riesgo; la oferta de la vacunación a las residencias de la tercera edad públicas y a sus trabajadores, y la oferta de la vacunación a trabajadores de granjas avícolas”.

Con respecto a este último punto, el conseller de Sanidad ha añadido que “se contempla la vacunación de trabajadores de granjas avícolas como una primera medida preventiva a adoptar –junto a la adquisición de 198.000 dosis de antivirales- ante la llamada gripe aviar”; si bien ha recordado que “la detección de algún caso de este tipo de gripe se trata de una eventualidad que, en estos momentos, no se da en nuestro ámbito geográfico, ni se tiene constancia de que se pueda dar”.

Resultados de la campaña 2004-2005

Según los datos de la Red Centinela de la Comunidad Valenciana, el número de casos y la tasa de incidencia de la gripe en la temporada 2004-2005 se situó por encima de la temporada anterior.


En este sentido, Rambla ha afirmado que “predominó la afectación juvenil, en el grupo de 15 a 24 años y el pico máximo de la incidencia –con una tasa de 461,86 casos por 100.000 habitantes- se observó en la semana 2 de 2005 –del 9 al 15 de enero-, pudiendo considerarse que la onda epidémica se extendió desde la semana 52 de 2004 hasta la semana 10 de 2005”.

Por lo que se refiere a la distribución de vacunas durante la temporada 2004-2005, el conseller de Sanidad ha destacado que “el 45,06% de las dosis se administraron a hombres y el 54,94%, a mujeres”.

“Por edades, el 67,40% de las dosis declaradas se administraron a mayores de 64 años, mientras que el 30,46% se administraron a personas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años; únicamente el 2,14% de las dosis declaradas se administraron a menores de 15 años”, ha señalado el Conseller.

Asimismo, Rambla ha afirmado que, durante la campaña 2005-2006, la Red Centinela de la Comunidad Valenciana “va a ampliar el espectro de análisis de la gripe de esta campaña”.

Vigilancia de la gripe 2002-2005



RESUMEN DE LA TEMPORADA GRIPAL 2004-2005 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fecha	Semana	Acontecimiento
3 de octubre	40	Inicio del sistema de vigilancia gripal
17 de octubre	42	Inicio de la toma de muestras
26 de diciembre	52	Primeros aislamientos virales
26 de diciembre	52	Comienzo del incremento de la incidencia
9 de enero	2	Pico máximo de incidencia
26 de febrero	8	Último aislamiento viral
12 de abril	13	Incidencia en niveles basales
21 de mayo	20	Finaliza el sistema de vigilancia

